

Check de kans!

Is er reden voor verwijzing naar een klinisch geneticus? 1x ja – dan verwijzen. Let op: bij sterke voorkeur wordt waar mogelijk de verwant met kanker verwezen, omdat DNA-diagnostiek in principe bij hem/haar zal starten.

Uw patiënt heeft geen kanker (gehad).

Zijn er aanwijzingen dat er een BRCA-mutatie in de familie zit? In de familie van uw patiënt komt het volgende voor:

- 1ste- of 2e graads verwant (man of vrouw) met een aangetoonde erfelijke aanleg voor borstkanker.
- 1ste graads verwante bij wie borstkanker is vastgesteld <40 jaar.
- 1ste graads verwante met borstkanker in beide borsten, waarbij de eerste tumor werd gevonden <50 jaar.
- 1ste graads verwante met borstkanker met meerdere primaire tumoren in één borst, waarbij de eerste tumor werd gevonden <50 jaar.
- 1ste graads verwante met een triple negatieve borsttumor <60 jaar.
- 1ste graads verwante met zowel borstkanker als alveesklierkanker.
- 1ste graads mannelijke verwant met borstkanker.
- 1ste graads verwante met borstkanker < 50 jaar; deze verwante heeft daarnaast een 1ste graads verwant met prostaatkanker < 60 jaar (of een Gleason score $\geq 7^*$).

- 1e graads verwant met prostaatkanker <60 jaar (of een Gleasonscore $\geq 7^*$); deze verwant heeft daarnaast een 1ste graads verwante met borstkanker <50 jaar aan dezelfde kant van de familie.
- 1ste graads verwante met borstkanker < 50 jaar; deze verwante heeft daarnaast een 1ste graads verwant met alvleesklierkanker aan dezelfde kant van de familie.
- 1ste graads verwant met alvleesklierkanker; deze verwant heeft daarnaast een 1e graads verwante met borstkanker <50 jaar aan dezelfde kant van de familie.
- 1ste graads verwante met borstkanker < 50 jaar; deze verwante heeft daarnaast [zelf] een 1ste graads verwante met borstkanker <50 jaar.
- Drie of meer 1ste graads en 2e graads verwanten met borstkanker aan dezelfde kant van de familie. Tenminste één van deze vrouwen was <50 jaar bij diagnose.
- 1ste graads verwante met borstkanker, ongeacht de leeftijd, en Joodse familie**.
- 1ste graads verwante met eierstok- of eileiderkanker.

*In plaats van Gleason score ≥ 7 kan ook de huidige classificatie ISUP ≥ 2 worden aangehouden. **Ongeveer 1 op de 40 personen met Ashkenazi Joodse familie is drager van een BRCA1 of BRCA2 genmutatie. Deze lijst is gebaseerd op de richtlijnen Borstkanker 2017/2025 en Erfelijk en familiair ovariumcarcinoom 2015/2022.